

Docteur DURAND

Adresse

CP VILLE

Tél

N° ADELI

Enfant BBB AAA

Age :

Poids :

1) Location d'un générateur d'aérosols pneumatique type :

- ◆ PARI SX +PARI LC sprint
- ◆ PARI turbo BOY + PARI LC PLUS
- ◆ ATOMISOR Abox plus + NL 9 M
- ◆ NEBAIR + FLO 35
- ◆ Econoneb AC 2000+MICRONEB III

Pour une durée de mois

2) Avec masque facial adapté

- Bébé
- Enfant
- Adulte
- Embout buccal

Le kit est à changer une fois par mois

Docteur DURAND

Adresse

CP VILLE

Tél

N° ADELI

Enfant BBB AAA

Age :

Poids :

1. PRESCRIPTION D'UNE CHAMBRE D'INHALATION

- Babyhaler®**
- Able Spacer®**
- Vortex®**
- Aerochamber®**
- Tipshaler®**

Nombre de chambres :

A partir de 4 ans, il est conseillé d'enlever le masque et de faire les inhalations par l'embout buccal.

2. CONSEILS D'UTILISATION :

◆ **LAVAGE 1 FOIS PAR SEMAINE**

Eau tiède + produit vaisselle – Rincer laisser sécher sans essuyer

◆ **SATURATION DE LA CHAMBRE**

Avec 5 bouffées d'un spray après nettoyage.

Docteur DURAND

Adresse

CP VILLE

Tél

N° ADELI

Enfant BBB AAA

Age :

Poids :

Ventoline® spray - (CIP 344 387 3)

Bien secouer le spray

2 bouffées matin et soir pendant 3 mois, à faire une par une

Augmenter à bouffées 4 fois par jour pendant les rhumes et bronchites

Flixotide® 50 spray - (CIP 336 703 7)

Bien secouer le spray

2 bouffées matin et soir pendant 3 mois, à faire une par une

Rincer la bouche

A doubler en cas de bronchite

A interrompre en cas de varicelle

Sérétide® 50 spray - (CIP 356 586 6)

Bien secouer le spray

2 bouffées matin et soir pendant 3 mois, à faire une par une

Rincer la bouche

A doubler en cas de bronchite

A interrompre en cas de varicelle

Docteur DURAND

Adresse
CP VILLE
Tél
N° ADELI

Enfant BBB AAA

Age :

Poids :

PATIENT -16 KG

- VENTOLINE (Salbutamol) 2,5 mg / 2,5 ml - (CIP 353 207 4)**
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
augmenter à 4 / jour, 8 jours en cas de bronchite ou crise d'asthme
Pas de dilution nécessaire

ou

- BRICANYL (Terbutaline) 5 mg / 2 ml - (CIP 365 733 8)**
1 ml à nébuliser matin et soir 3 mois (à l'aide d'une seringue de 1ml)
augmenter à 4 / jour, 8 jours en cas de bronchite ou crise d'asthme
Dans ce cas, rajouter 1 ml de sérum physiologique dans les aérosols supplémentaires

AVEC

- PULMICORT (Budésonide) 1 mg / 2 ml - (CIP 337 356 9)**
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
Bien rincer la bouche et le visage
Interrompre en cas de Varicelle

ou

- BECLOSPIN (Béclométhasone) 800 µg / 2 ml - (CIP 369 635 0)**
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
Bien rincer la bouche et le visage
Interrompre en cas de Varicelle

Docteur DURAND

Adresse

CP VILLE

Tél

N° ADELI

Enfant BBB AAA

Age :

Poids :

PATIENT + 16 KG

- VENTOLINE (Salbutamol) 5 mg / 2,5 ml - (CIP 353 211 1)**
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
augmenter à 4 / jour, 8 jours en cas de bronchite ou crise d'asthme

ou

- BRICANYL (Terbutaline) 5 mg / 2 ml 1 dosette - (CIP 365 733 8)**
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
augmenter à 4 / jour, 8 jours en cas de bronchite ou crise d'asthme

AVEC

- PULMICORT (Budésonide) 1 mg / 2 ml - (CIP 337 356 9)**
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
Bien rincer la bouche et le visage
Interrompre en cas de Varicelle

ou

- BECLOSPIN (Béclométhasone) 800 µg / 2 ml - (CIP 369 635 0)**
1 dosette à nébuliser matin et soir 3 mois
Bien rincer la bouche et le visage
Interrompre en cas de Varicelle

PAS DE DILUTION NECESSAIRE

FICHE TECHNIQUE - LA NEBULISATION

POURQUOI ?

L'asthme se traite par des médicaments dont l'objectif est de :

- ◆ Dilater les bronches
 - ◆ Diminuer l'inflammation
- pour améliorer la respiration.

La nébulisation transforme le médicament en un nuage de fines gouttelettes.

Les avantages de cette voie sont :

- ◆ La diffusion constante du produit
- ◆ L'humidification de l'air inhalé
- ◆ La déposition pulmonaire est plus profonde
- ◆ Enfin il n'y a pas besoin de la participation active de l'enfant.

COMMENT ÇA MARCHE

L'appareil est constitué :

- ◆ D'une source d'énergie qui permet de pulvériser le médicament (le **compresseur**).
- ◆ D'un tuyau de connexion et d'un **nébuliseur** (récipient en plastique dans lequel on verse le médicament qui sera transformé en fines gouttelettes).
- ◆ D'un masque facial ou d'un embout buccal

En traitement de fond (utilisation journalière) le kit de nébulisation masque + tuyau doit être changé régulièrement.

La fréquence du changement du kit dépend du fabricant de l'appareil.

DEROULEMENT


- ◆ Se laver les mains
- ◆ Ouvrir les dosettes et les verser dans le nébuliseur (inutile de diluer le produit).
- ◆ Si c'est un enfant, l'asseoir sur vos genoux
- ◆ Placer le masque jusqu'à 4 ans puis, **pour une meilleure efficacité du traitement préférer l'embout buccal dès 4 ans jusqu'à l'âge adulte**
- ◆ Mettre l'appareil en marche (en veillant à ce que le nébuliseur reste bien vertical)

- ◆ Pour l'enfant, il doit respirer normalement (éviter de le faire parler). Afin d'optimiser l'efficacité du traitement, il est préférable de faire une pause si l'enfant pleure ou s'il est essoufflé.
- ◆ La séance terminée, le générateur ne produit presque plus de brouillard. Il est normal qu'il reste un peu de liquide dans le nébuliseur.

Durée moyenne de 10 à 15 minutes même s'il reste du produit dans le nébuliseur.

Pour l'enfant, pensez à lui raconter une histoire.

ENTRETIEN DU KIT



Nettoyage (après chaque séance)

- ◆ Nettoyer le visage de l'enfant avec de l'eau si utilisation du masque et lui faire rincer la bouche
- ◆ Laver toutes les pièces du nébuliseur à l'eau chaude et au produit vaisselle (sans le tuyau)
 - . Rincer
 - . Sécher soigneusement
- ◆ Ranger le kit à l'abri de la lumière dans un récipient propre et sec ou dans du papier aluminium par exemple, en attendant sa prochaine utilisation.

Stérilisation tous les jours dans la mesure du possible, mais jamais moins d'une fois par semaine (Attention en cas de prise d'antibiotique stérilisation quotidienne obligatoire)

- ◆ Technique avec :
 - . une solution de stérilisation à froid,
 - . de l'eau bouillante (15 mn),
 - . ou une solution eau froide + javel
- Rincer et sécher

A NE PAS FAIRE

Laisser un enfant seul
Eviter tout contact avec les yeux
Utiliser un nébuliseur sale
Tordre ou pincer la tubulure
Ne jamais tenter de réparer ou de déboucher avec 1 aiguille le kit.

L'appareil doit être entretenu et le filtre changé régulièrement par votre pharmacien ou le prestataire de service